

PÂTE À DÉCORNER Dr. Naylor

DIN 00297836

Usage vétérinaire seulement

Ingrédients actifs :

Hydroxyde de sodium	24,88% (p/p)
Hydroxyde de calcium (provenant d'hydroxyde de calcium magnésium)	21,5% (p/p)

MODE D'EMPLOI

POURQUOI DÉCORNER

Les cornes sont une des principales causes de blessure du pis et des trayons des vaches laitières et de meurtrissures des carcasses et de peau endommagée des boeufs de boucherie. Les bovins qui ont des cornes sont plus agités et très peu peuvent être transportés en toute sécurité en camion et ont besoin deux fois plus d'espace pour s'alimenter que les bovins décornés. Les bovins décornés peuvent être manipulés avec plus de facilité et plus de sécurité.

QUAND DÉCORNER

La pâte à décorner du Dr Naylor peut être employée avec succès chez les animaux de moins de 2 mois. Toutefois, elle s'utilise plus facilement chez les jeunes veaux. Plus le veau à traiter est jeune, meilleurs sont les résultats; le choc et la douleur sont plutôt négligeables et le décornage est fait rapidement et économiquement.

La pâte à décorner peut être utilisée dans la plupart des régions durant toute l'année - aucun sectionnement - aucun saignement. Si un coupe-corne automatique est utilisé, il est préférable de décorner seulement durant la saison froide lorsque les mouches ne peuvent causer de dommages aux plaies ouvertes.

COMMENT DÉCORNER

Jeunes veaux : À l'aide d'un ciseau ou d'une tondeuse, enlever les poils sur et alentour du bourgeon des cornes. Sur l'animal âgé de 1 à 7 jours, appliquer en une seule fois à l'aide d'un applicateur en bois, une mince couche de pâte à décorner équivalente à la grandeur d'un cinq sous. Sur les animaux de plus de 7 jours, appliquer une quantité équivalente à la grandeur d'un vingt-cinq sous, en une seule fois. Veaux plus âgés : Pour décorner les veaux âgés de 6 à 8 semaines, lorsque le bourgeon des cornes a commencé à pousser, enlever les poils et, à l'aide d'un grattoir ou d'une lime, gratter légèrement la gaine entourant la base des cornes, d'une largeur d'environ 5 mm (attention de ne pas faire saigner l'animal). Appliquer en une seule fois, une mince couche de la pâte à décorner sur le bourgeon des cornes ainsi que sur la gaine alentour du bourgeon des cornes. Autant que possible, appliquer une mince couche uniforme et seulement selon le mode d'emploi. La raison pour laquelle nous recommandons d'enlever les poils sur le bourgeon des cornes avant d'appliquer la pâte est qu'il est plus facile de voir si l'application est à la bonne place et en contact direct avec la peau. Afin de bien retenir la pâte à décorner, former un cercle autour du bourgeon des cornes avec le Baume à pis du Dr Naylor ou de la gelée de pétrole avant l'application. Si les animaux à décorner sont confinés dans un enclos restreint, les attacher dans un endroit éloigné des autres animaux pendant 1 journée afin de les empêcher de se frotter les uns contre les autres et d'étendre la pâte. Garder les animaux à l'abri de la pluie pour au moins 6 heures après l'application de la pâte à décorner. Moutons et chèvres : Appliquer une mince couche uniforme équivalente à la grandeur d'un dix sous. Une application trop épaisse peut causer une pénétration et une activité trop profonde et incommoder l'animal. Il est recommandé d'enlever la pâte et de laver à fond avec de l'eau, 20 à 30 minutes après l'application. Afin de neutraliser l'effet de la pâte, enlever l'excès de pâte et laver à fond avec de l'eau suivie de vinaigre. Bien faire attention à ce que la pâte ne vienne pas en contact avec les yeux des animaux. Lorsque vous décornerez des agneaux ou des chevreaux, les envelopper dans une couverture pour quelques temps afin de les empêcher de se frotter les cornes avec leurs sabots.

MISE EN GARDE : Ce produit est caustique. Doit s'appliquer seulement avec un applicateur de bois et selon le mode d'emploi.

Garder le pot fermé et entreposer dans un endroit sûr. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

PREMIERS SOINS

EXTERNE : Laver abondamment avec de l'eau puis avec du vinaigre.

INTERNE : Donner oralement une quantité abondante de vinaigre ou simplement de jus de citron, de pamplemousse ou d'orange suivi d'huile d'olive.

YEUX : Laver avec une solution à 5% d'acide borique.

APPELER UN MÉDECIN

Fabriqué par : H.W. Naylor Co. Inc., Morris, NY 13808

Net 114 g (4 oz.)

NAC No.: 12930011